



日本人の半数以上が患っている[※]と言われる痔ですが・・・
※随説あります。

ボラギノールホームページより

実は男女でなりやすい痔の種類には違いがあります。



お尻の代表的な病気である痔には、大きく分けて“痔核”“痔瘻”“切れ痔”の3つがあります。



いぼ痔 (内痔核) は、排便時の負荷などにより、歯状線より上の粘膜下の静脈叢がうっ血してできた、いぼ状のはれを指します。このあたりの組織には知覚神経 (痛みを感じる神経) が通っていないことから、痛みを感じることは少なく、出血によって初めて痔に気づく場合も多いようです。排便時に便器が真っ赤になるほど大量の血が出ることもあります。症状が進むと排便時にいぼが肛門の外に出てきたり、炎症などによる痛みを感じたりすることがあります。

実は2種類ある！？いぼ痔 (痔核) とは…？



- いぼ痔 (内痔核) の主な症状
- 痛みはない (少ない)
 - 排便時に出血する (鮮血がポタポタ、またはシューッとほとぼしる)
 - 肛門からいぼが出てくる

- いぼ痔 (外痔核) の主な症状
- 痛みがある
 - 大きくはれると激しく痛む

いぼ痔 (外痔核) は、排便時の負荷などによって、歯状線より下の皮膚部分の静脈叢がうっ血してできた、いぼ状のはれを指します。肛門外側の皮膚には、知覚神経 (痛みを感じる神経) が通っているため、いぼ痔 (外痔核) ではほとんどの場合、痛みを感じます。また急性の炎症をおこし、血栓 (血のかたまり) ができて大きくはれ、激しく痛みます。


【男性 500 名に聞いた尿漏れ実態】

男性の 3 人に 1 人が “ちょい漏れ” 経験者！


実は30代以上の男性は、3人に1人が“ちょい漏れ”による「尿シミ」の経験があることがわかりました※。
それなのに男同士でもあまり語られないヒミツの実態とは！？

※日本全国の30～69歳男性1万人を対象としたWeb調査において、
尿をした後、キレが悪く尿が少ししみた経験があると回答した人数から算出（2019年12月花王調べ）

Q. ズボンの尿シミを最初に経験したのはいくつの頃ですか？



Q. ズボンの尿シミの頻度はどのくらいですか？



〔調査概要〕



ズボンに尿がしみた経験がある、30～69歳男性を対象としたWeb調査（2019年12月花王調べ）。

実態1、2の回答者は516名。実態3、4の回答者は尿のしみ出しが気になると回答した504名。

調査の設問中では「ズボンへの尿シミ」を「排尿後の下着からズボンへの尿のしみ出し」としています。



①痔_案A 微量

365仕様 ナプキン装着可
(メッシュD9617S+防水布)





①痔_案B 微量

三角マチ仕様 ナプキン装着可
(メッシュD9617S+防水布)



①痔_案C 10cc程度

浮きマチ仕様 ナプキン装着可
a (粗メッシュ+メッシュD9617S+防水布)
b (粗メッシュ+吸水体+防水布)
c (メッシュD9617S+粗メッシュ+吸水体+防水布)



メンズ ①痔/②尿/③痔+尿 ボクサーパンツ

2023.6.6








②尿 20cc程度


③痔 (微量) +尿 (むれしらず) _案A

③痔+尿_案B

365仕様 ナプキン装着可
(メッシュD9617S+防水布)

INパンツ





 メッシュ

 吸収体 ×1

 防水布

 (ラミネート↓向き)

